

Cette espèce offre l'aspect extérieur de *B. himalayanus* Günth., abstraction faite de la crête interorbitaire dont celle-ci est pourvue; mais c'est avec *B. Raddei* Strauch qu'elle a le plus d'affinités et dont elle diffère surtout par sa forme plus élancée, un museau plus allongé et creusé en gouttière, par des parotides plus longues, une palmature des orteils plus développée, un tubercule métatarsien externe plus petit, enfin par sa coloration.

---

MISSION GÉODÉSIQUE DE L'ÉQUATEUR.  
COLLECTIONS RECUEILLIES PAR LE D<sup>r</sup> P. RIVET.

**Coléoptères : Ptinides. Anthicides et Hylophilides,**

PAR M. MAURICE PIC.

Les récoltes du D<sup>r</sup> P. Rivet comprennent peu d'espèces mais, à défaut du nombre, il y a la qualité, car deux *Ptinus* sont nouveaux. J'ai étudié un seul *Trigonogenius* pas très frais qui me paraît devoir se rapporter au *T. tropicus* Kirsch., un seul *Hylophilus*, variation du *H. boliviensis* Pic, et l'*Anthicus chilensis* Sol. Ces divers insectes font partie des Collections du Muséum de Paris<sup>(1)</sup> : je vais en donner l'énumération, avec indication des localités où ils ont été capturés; ensuite je décrirai les deux espèces nouvelles découvertes par le D<sup>r</sup> Rivet, à qui je suis heureux de dédier l'une de celles-ci.

TRIGONOGENIUS ? TROPICUS Kirsch., Équateur : Loja.

**Ptinus Riveti** nov. sp. Pérou : Paita et Tallazo de Paita (région désertique, au bord de la mer).

**Ptinus paulopictus** nov. sp. Équateur : Casitagna et Pimillar : 2,900 à 3,500 mètres d'altitude.

ANTHICUS CHILENSIS Sol. Équateur; environs de Riobamba.

HYLOPHILUS BOLIVIENSIS Pic var. ÉQUATEUR : CHILLACOCHA, 3,900 mètres d'altitude.

**Ptinus Riveti** nov. sp.

Satis latus, nigro-piceus aut pro parte rufescens, longe hirsutus, fasciculatus, plus minusve sat dense albo pubescens, antennis pedibusque testaceis.

Assez large, noir de poix, ou en partie roussâtre, orné de longs poils dressés et fasciculé de noir ou de brun obscur sur le milieu des élytres,

(1) Les *Ptinus Riveti* et *paulopictus* mihi figurent aussi dans la collection Pic.

plus ou moins et assez densément pubescent de blanchâtre, antennes et pattes testacées, parfois avec les cuisses un peu obscurcies. Tête moyenne; yeux grands, plus gros chez ♂, et écartés entre eux; antennes grêles, plus longues chez ♂; prothorax court, fortement élargi en avant, étranglé près de la base et élargi ensuite, orné sur son milieu de 2 ou 4 crêtes pileuses peu élevées, faites de poils jaunâtres ou foncés; écusson densément pubescent de blanc; élytres bien plus larges que le prothorax, à épaules droites, relativement courts, un peu rétrécis postérieurement, assez fortement striés-ponctués, mais les stries d'ordinaire voilées par la pubescence blanchâtre, passant du jaunâtre vers la suture ou sur la base, qui recouvre plus ou moins densément les élytres, sauf sur leur milieu externe, en laissant quelques parties plus densément pubescentes que d'autres; sur le milieu du disque et près de la suture, un ou deux fascicules de poils noirs ou d'un brun obscur; pattes testacées avec les cuisses parfois en parties obscurcies. Long. 3 — 3 m. 5.

Pérou (Dr P. Rivet).

Voisin de *Gounellei* Pic, du Brésil, en diffère par son revêtement pileux, les yeux moins gros, surtout chez ♂, etc.

#### **Ptinus paulopictus nov. sp.**

Subelongatus, subnitidus, pro parte niger, pro parte rufescens, longe hirsutus, fasciculatus, in medio ad basin et apicem plus minusve griseo aut luteo pubescens; antennis pedibusque pro majore parte rufescentibus.

Un peu allongé, assez brillant, noir avec les élytres plus ou moins roussâtres au milieu vers la suture et sur leurs extrémités, orné de longs poils dressés et fasciculé de noir, au moins à l'état frais, sur le milieu des élytres, orné d'une pubescence en partie grise, en partie jaune, irrégulièrement et peu densément disposée. Tête médiocre avec les yeux peu gros et écartés; antennes grêles, plus ou moins longues suivant les sexes, rousses; prothorax pas très court, modérément élargi en avant, étranglé près de la base, puis élargi ensuite, orné sur son milieu, à l'état frais, de 4 petites crêtes pileuses peu élevées, faites de poils noirs ou parfois jaunâtres; écusson pubescent de grisâtre; élytres bien plus larges que le prothorax, assez longs, un peu rétrécis postérieurement, fortement striés-ponctués avec les intervalles étroits, et ornés, près de la suture, sur la base et l'extrémité d'une pubescence en partie grisâtre, en partie jaunâtre, irrégulièrement disposée, dessinant de vagues mouchetures postérieures; sur le milieu du disque de chaque élytre, et près de la suture, un fascicule pas très accentué de poils noirs; pattes rousses avec les cuisses plus ou moins obscurcies. Je crois devoir attribuer à cette espèce comme ♂ un exemplaire de Pinuflar assez défloré, dont les antennes sont très longues et les yeux un peu plus grands, tandis que le prothorax est roussâtre.

Long. 3 m. 5 — 4 mètres.

Équateur (D<sup>r</sup> P. Rivet).

Diffère de la précédente espèce, en outre de son revêtement pileux différent, par la forme un peu allongée et le prothorax moins élargi en avant.

---

MISSION GÉODÉSIQUE DE L'ÉQUATEUR.  
COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. LE D<sup>r</sup> RIVET.

**Orthoptères Forficulides.**

PAR LE D<sup>r</sup> A. BORELLI.

**Idolopsalis** nov. gen.

Tête convexe, plus longue que large. Antennes de 15 articles : le 1<sup>er</sup> long, cylindro-conique, rétréci à la base; le 2<sup>e</sup> très court, cylindrique; le 3<sup>e</sup> cylindrique, ayant à peu près la moitié de la longueur du 1<sup>er</sup> et moitié plus grêle; le 4<sup>e</sup> et le 5<sup>e</sup> conico-ovoïdes, plus longs que larges; le 4<sup>e</sup> plus long que le 2<sup>e</sup>; le 5<sup>e</sup> plus long que le 4<sup>e</sup>; le 6<sup>e</sup> à peu près de la longueur du 3<sup>e</sup>; les suivants s'allongeant et s'amincissant graduellement et passant de la forme conique à la claviforme, les derniers très grêles.

*Pronotum* subcarré, un peu plus large postérieurement qu'antérieurement, plus large que long.

*Mesonotum* transversal, son disque plat, ses côtés convexes.

*Metanotum* convexe, un peu plus large que le mesonotum, trapézoïdal, son bord postérieur concave.

*Prosternum* à peu près deux fois aussi long que large, fortement échancré à l'insertion des hanches antérieures.

*Mesosternum* et *metasternum* plus larges que longs avec le bord postérieur coupé droit, dépassant à peine les hanches médianes et postérieures.

*Fémurs* peu robustes, un peu plus longs que les tibias; 1<sup>er</sup> article des tarses sensiblement plus long que les deux suivants réunis, le 2<sup>e</sup> très court, prolongé en une touffe de poils longs.

*Abdomen* subcylindrique légèrement dilaté vers le milieu, puis se rétrécissant de telle façon que le bord postérieur du dernier segment est de même largeur que celui du premier. Plis tuberculiformes des 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> segments peu accusés. Dernier segment dorsal court, transversal avec le bord postérieur légèrement concave.

*Péniultième segment ventral* ♂ : grand, semi-circulaire avec le bord postérieur légèrement échancré, découvrant de chaque côté un petit triangle du dernier segment; ♀ : plus allongé, a la forme d'un triangle à côtés curvilignes et à sommet arrondi.

*Pygidium* non saillant, vertical.